



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

A Zala Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) a felsorolt települések szőlő ültetvényeiben a 2013 - 2024. évek növény-egészségügyi felderítései során szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) zárlati károsító okozta fertőzést állapított meg, mely következtében a felsorolt településekre vonatkozóan

N Ö V É N Y - E G É S Z S É G Ü G Y I Z Á R L A T - o t r e n d e l t e l .

A zárlati károsítóval fertőzött, illetve a fertőzés tüneteit mutató szőlő ültetvények 1 km-es körzetében lévő települések érintett bel- és külterületi (zártkerti) - ingatlanain található szőlő ültetvényeket és szőlő növényeket fertőzött területté nyilvánította.

A fertőzött területek 3 km-es körzetében lévő települések érintett bel- és külterületi (zártkerti) - ingatlanain található szőlő ültetvényeket és szőlő növényeket védő (puffer) körzetté jelölte ki.

A fertőzött területet és védő (puffer) körzetet körülhatárolt területté nyilvánította.

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma ellen jelenleg növényvédő szer nem áll rendelkezésre, ezért a hatékony védekezési mód:

- a fertőzött szőlő tőkék kivágása és
- a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés

A zárlati fertőzés terjedésének elkerülése és a betegség felszámolásának érdekében a körülhatárolt terület minden szőlő növény és ültetvény tulajdonosa, valamint használója az alábbi előírásokat köteles betartani:

Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus), mint a zárlati károsítót terjesztő rovarvektor ellen kötelező a védekezés a következők szerint. A zárlat fenntartásáig a rovar biológiájához időzített, a vegetációs időszakban (június közepétől kezdődően) minimum 3 alkalommal kötelező a rovarölő szerek védekezése. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által a **körülhatárolt területeken** elvégzett felmérések szerint **az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus)** imágójának egyedszáma július közepén már minden felvételezési ponton elérte, sőt egyes helyeken jelentősen meg is haladta a védekezési küszöböt, ezért **a további kötelező védekezéseket** - az élelmezés-egészségügyi várakozási időt, illetve az engedélyokirat egyéb előírásait figyelembe véve – is **szükséges elvégezni**, a kezelésekről nyilvántartást (permetezési naplót) szükséges vezetni, melyet az utolsó bejegyzéstől számított 3 évig meg kell őrizni ! **A felhasználható rovarölő szerek listája a védekezési felhívás mellékletében megtalálható.**

A táblázatban felsorolt eltérő hatóanyag tartalmú rovarölő szereket a szerrotáció kialakítása miatt **felváltva szükséges használni**. Mivel a táblázat a növényvédő szerek jelen felhívás kiadásának napján hatályos engedélyokiratai alapján készült, ezért az engedélyokiratokban történt módosításokat a készítmény felhasználása előtt ellenőrizni szükséges!

(<https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny>)

AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY
NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.

Telefon: (36 92) 550-160, E-mail: noveny.talajvedelem@zala.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

A növényvédő szerek kijuttatása során - adott esetben - figyelmet kell fordítani a gyártó ajánlása szerint a permetlé pH-jának beállítására, valamint a növényvédő szerek UV érzékenysége miatt a kijuttatás napszakának a megválasztására.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy a védekezés során az integrált növényvédelem alapelveinek érvényre jutása érdekében a növényvédelmi technológia meghatározása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére, ezért a növényvédő szerek okirataiban meghatározott kezelések évenkénti maximális számának betartása mindenkor szükséges. Ezen túl figyelmet kell fordítani a növényvédő szer használat sorrendjére is, hogy a későbbi kezelés során olyan növényvédő szert tudjanak még kijuttatni, amely az akkori szőlő (fürt) fejlettségi/érettségi állapotában még engedélyezett és az ételmezés-egészségügyi várakozási idő is betartható legyen, valamint védelmet nyújtson az amerikai szőlőkabóca kifejlett alakja ellen is.

Jelen felhívás az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakmai javaslatának is tekintendő, így az agrár-környezetvédelmi programban szereplő támogatást igénylők egyszeri alkalmazásra az engedélyben foglaltaknak megfelelően felhasználhatják a környezetkímélő besorolásba nem került növényvédőszer-hatóanyagokat.

Az agrár-környezetvédelmi programban szereplő kedvezményezettek a pályázati felhívás részletszabályait tartalmazó 2b. mellékletének 2.1 pontja szerint jelen védekezési felhívás szerint a Nemzeti Irányító Hatóság által közleményben közzétett nem, vagy csak korlátozással használható növényvédő szert is felhasználhatnak a körülhatárolt területen belül. Az ilyen felhasználás **vis maior eseménynek minősül**, amely elismertetése a Nemzeti Kifizető Ügynökségnél szükséges. A vis maior elismerése iránti kérelmet és annak bekövetkezését igazoló dokumentumokat az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint a vis maior kérelem benyújtására szolgáló felületen keresztül kell benyújtania a kedvezményezetnek.

Az agrár-ökológiai programban (AÖP) pedig a méhekre veszélyes szerek használati tilalma ültetvényekben gyakorlatot választóknak az engedélyokirat alapján méhekre kifejezetten vagy mérsékelten veszélyes, illetve kockázatos besorolású növényvédő szerek használata tilos.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vizsgálata szerint, a szőlő sárgaság betegség tünetei az idei évben korábban jelentek meg. A levelek sodródása és a levéllemezek elszíneződése, valamint a virágzatok elszáradása már megtörtént, egyes fajtáknál a kialakult bogyók töppedése is elkezdődött. **A szőlő aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezés másik pillére ebben az időszakban a szőlő növények folyamatos szemlézése.**

A fertőzési gyanú bejelentése kötelező az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére (Tel: 06/92/550-160, E-mail: noveny.talajvedelem@zala.gov.hu) **a védő (puffer) zónába sorolt települések, illetve a zárlati intézkedéssel még nem érintett települések esetében a leveles hajtások eltávolítása, a tőke kivágása előtt.** A fertőzési gyanú bejelentését követően az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni szemle során jelöli meg a tünetes szőlő növényeket és határozatban rendeli el azok kivágását, illetve közli a további zárlati előírásokat.

A fertőzött körzetbe tartozó településeken az előző évek során elrendelt zárlati intézkedésnek megfelelően a tüneteket mutató, a további fertőzés forrását és a betegség fennmaradását biztosító tőkéket gyökerestől ki kell kivágni és megsemmisíteni.

A körülhatárolt területről hatósági engedély nélkül szőlő növényt, szőlő szaporító- és ültetési anyagot, egyéb gazdanövényt: erdei iszalagot (*Clematis vitalba*) kivinni, illetve a károsító terjedését elősegítő terméket, anyagot, eszközt a területre bevinni tilos!

A szőlő arany színű sárgaság fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca rovar szőlővesszőkre esetlegesen lerakott tojásainak elpusztítása érdekében a tél végi metszéssel eltávolított vesszőket égetéssel kell megsemmisíteni, valamint tavasszal a rügyfakadás közeli időszakban olajos (paraffin- vagy vazelinolaj) készítményekkel kell gyéríteni a vesszőkön áttelelő tojások számát.

Fontos ! Az eredményes védekezés feltétele, hogy minden szőlőtermelő védekezzen a védekezési felhívás figyelembevételével, és ne veszélyeztesse sem a saját, sem a szomszédos termelők növényvédelmi, növény-egészségügyi biztonságát a védekezés elmulasztásával.

Zárlati intézkedéssel érintett települések - **fertőzött körzet** :

Alsónemesapáti, Alsórajk, Bak, Babosdöbréte, Baktüttös, Balatongyörök, Barlahida, Becsehely, Belezna, Bocfőde, Bocska, Boncodfőde, Böde, Börzönce, Bucsuszentlászló, Bucsuta, Csapi, Csátár, Csertegtomaj, Csertalakos, Csonkahegyhát, Csörnyefőld, Dióskál, Dobri, Egervár, Eszteregnye, Felsőrajk, Fityeháza, Fűzvölgy, Galambok, Garabonc, Gellénháza, Gelse, Gelsesziget, Gosztola, Gősfő, Gutorfőde, Hahót, Hernyék, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Iklódbördőce, Iborfia, Kacorlak, Kávás, Kehidakustány, Kemendollár, Keménfa, Kerkaszentkirály, Kerkateskánd, Kilimán, Kiscsehi, Kiskutas, Kispáli, Kisércse, Kistolmács, Kerecseny, Lakhegy, Lendvadedes, Lenti, Letenye, Lickóvadás, Lovászi, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Milejszeg, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagykápolnak, Nagylengyel, Nagypáli, Nagyrécsse, Nemeshegy, Nemesszentandrás, Nova, Ormándlak, Orosztony, Padár, Pacsa, Páka, Pálfi, Petőhenye, Petrikeresztúr, Petrivente, Pölöske, Pölöskefő, Pötréte, Pusztaderics, Pusztamagyaród, Pusztaszentlászló, Rédcis, Rigyác, Salomvár, Sárhida, Sármellék, Söjtör, Szentgyörgyvár, Szentkozmadombja, Szentlászló, Szentpéterfőde, Szécsisziget, Tekenye, Teskánd, Tófej, Tormafőde, Tornyszentmiklós, Tótszentmárton, Túrje, Újudvar, Vasboldogasszony, Vállus, Váravölgy, Vindornafok, Vonyarcvashegy, Zajk, Zalaboldogfa, Zalaegerszeg, Zalaigrice, Zalaháshágy, Zalaistván, Zalalövő, Zalakaros, Zalakoppány, Zalamerenye, Zalasabar, Zalaszentbalázs, Zalaszentgrót-Aranyod, -Csáford, -Zalaudvarnok, Zalaszentgyörgy, Zalaszentjakab, Zalaszentlászló, Zalaszentmihály, Zalatárnok, Zalaudvarnok, Zebecke,

Zárlati intézkedéssel érintett települések – **védő (puffer) zóna**:

Alibánfa, Almásháza, Alsópáhok, Bagod, Becsvölgye, Bezeréd, Bókaháza, Borsfa, Csőde, Csömödér, Dobronhegy, Dötk, Egeraracs, Esztergályhorváti, Felsőpáhok, Gétye, Gomboszeg, Gyenesdiás, Gyülevész, Gyűrűs, Hévíz, Hottó, Iborfia, Keszthely, Kisbucsa, Kisgörső, Kissziget, Maróc, Miháld, Mihályfa, Mikekarácsonyfa, Misefa, Muraszemenye, Nagykutas, Nemesapáti, Nemesrádó, Nemessándorháza, Németfalu, Óhid, Oltárc, Orbánosfa, Pakod, Pókaszeptek, Sand, Semjénháza, Sénye, Sormás, Surd, Szalapa, Szentmargitfalva, Szentpéterúr, Szepetnek, Szilvagy, Tilaj, Tilajújhegy, Tótszerdahely, Valkonya, Vindornyaszlós, Vöckönd, Zalaapáti, Zalacsány, Zalacséb, Zalaköveskút, Zalasárszeg, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Zalaszentmárton, Zalaújlak

Zalaegerszeg, 2025. július 17.

Dr. Sifter Rózsa főispán nevében és megbízásából:

Szabó Béla
osztályvezető

Melléklet a védekezési felhíváshoz

	Amerikai szőlőkabócák ellen engedélyezett szerek szőlőben	Hatóanyag	Forgalmazási kategória	A kezelés évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam	Az utolsó kezelés fenostádiuma	Méhveszélyesség
Kontakt	Decis ¹	deltametrin	III.	2	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	mérsékelt kockázatos
	Decis Mega (PL) ¹	deltametrin	II.	3	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	mérsékelt kockázatos
	Decis Forte ¹	deltametrin	I.	2	14 nap	szedés érettség (BBCH 87)	mérsékelt kockázatos
	Detector ¹	deltametrin	I.	2	14 nap	szedés érettség (BBCH 87)	mérsékelt kockázatos
	Kaiso Garden ²	lambda-cihalotrin	III.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	K1 ²	lambda-cihalotrin	III.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Kaiso EG ²	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Kaiso Sorbie ²	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Wakizasi ²	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Hunter ²	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Jager EG ²	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Karate Zeon 5 CS (BG, PL, RO) ²	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Karate Zeon 050 CS ²	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Ninja Zeon 5 CS ²	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Kendo 5 CS ²	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Full 5 CS ²	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt kockázatos
	Lamdex Extra ²	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelt veszélyes
	Klartan 24 EW	tau-fluvalinát	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
	Mavrik 24 EW	tau-fluvalinát	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
	Monospel 24 EW	tau-fluvalinát	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
	Laser	spinozad	II.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelt kockázatos
	Nexsuba	spinozad	II.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelt kockázatos
	Laser Duplo ³	spinozad	II. ; III.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelt kockázatos
	Pyregard ³	piretrin	I.	2	7 nap	n.a.	kifejezetten kockázatos
Felszívódó	Sivanto Prime ^{2,4}	flupiradifuron	I.	1	-	zsendülés (BBCH 81)	nem jelölésköteles
	Sanium System ²	flupiradifuron	II. ; III.	1	-	érés kezdete (BBCH 82)	nem jelölésköteles
	Deltam System ²	flupiradifuron	II. ; III.	1	-	érés kezdete (BBCH 82)	nem jelölésköteles
	Sivanto Energy ^{1,2}	deltametrin + flupiradifuron	I.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)	kifejezetten veszélyes
	Exirel ¹	ciántraniliprol	I.	2	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	kifejezetten veszélyes
	Mospilan 20 SG (DE, RO) ⁴	acetamiprid	III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles

Rafting⁴	acetamiprid	III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles
Spilan 20 SG⁴	acetamiprid	III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles
Gazelle 20 SG⁴	acetamiprid	III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles

Megjegyzés:

- ¹ agrár-környezetvédelmi programban tiltott, de jelen védekezési felhívás alapján felhasználható
- ² Kizárólag a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 1. § 10. pontja szerinti szakirányító írásbeli javaslatára használható vagy a „Növényvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba” vállalás választásakor
- ³ ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett a felhasználása
- ⁴ tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki.
- ⁵ Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki.